

PATIENTENFRAGEBOGEN

IPSS-Score

(International prostate symptom score)



Patient:

Ausfülldatum:

Mögliche Beschwerden im Zusammenhang mit einer Prostatavergrößerung bei Männern.

Fragen	<u>niemals</u>	<u>seltener</u> als in 1 von 5 Fällen (< 20%)	<u>seltener</u> als in der Hälfte aller Fälle	<u>ungefähr</u> in der Hälfte der Fälle (ca. 50%)	in <u>mehr</u> als der Hälfte aller Fälle	fast <u>immer</u>
> Wie oft hatten Sie das Gefühl, dass Ihre Blase nach dem Wasserlassen nicht ganz entleert war?	①	②	③	④	⑤	⑥
> Wie oft mussten Sie innerhalb von 2 Stunden ein zweites Mal Wasserlassen?	①	②	③	④	⑤	⑥
> Wie oft mussten Sie beim Wasserlassen mehrmals aufhören und wieder neu beginnen (Harnstottern)?	①	②	③	④	⑤	⑥
> Wie oft hatten Sie Schwierigkeiten das Wasserlassen hinauszuzögern?	①	②	③	④	⑤	⑥
> Wie oft hatten Sie einen schwachen Strahl beim Wasserlassen?	①	②	③	④	⑤	⑥
> Wie oft mussten Sie pressen oder sich anstrengen, um mit dem Wasserlassen zu beginnen?	①	②	③	④	⑤	⑥
	niemals	1x	2x	3x	4x	5x oder mehr
> Wie oft sind Sie im Durchschnitt nachts aufgestanden um Wasser zu lassen?	①	②	③	④	⑤	⑥

IPSS-Score (Stärke der Symptome: <8 mild | 8-19 stark | ≥19 sehr stark)

Lebensqualitätsindex (QoL)

Bewertung ~~☒~~

	ausgezeichnet	zufrieden	überwiegend zufrieden	teils zufrieden, teils unzufrieden	überwiegend unzufrieden	unglücklich
> Wie würden Sie sich fühlen, wenn sich Ihre jetzigen Symptome beim Wasserlassen künftig nicht mehr ändern würden?	①	②	③	④	⑤	⑥